

THE PHOTODUPLICATION

OF THE MANUSCRIPT

IN THE LIBRARY OF THE

AMERICAN UNIVERSITY

AND THE NATIONAL ARCHIVES

WASHINGTON, D.C.

PROZATONIS

THE PROZATONIS

ANALYSIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

THE PROZATONIS

ΠΕΡΙ
ΤΗΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ
ΩΣ ΟΥΚ ΑΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΞΕΣΙΝ ΑΜΑ
ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΣΙ ΠΥΡΕΤΟΙΣ

^{Ψηφίσματι}
Τοῦ ἐπιφανεστάτου τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ Φριδερικῇ
ἰατρῶν συνεδρίου,

ΠΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΚΛΑΜΠΡΟΤ. ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑ ΒΥΧΝΕΡΟΥ

Τοῦ ῥωμαϊκοῦ κράτους εὐγενοῦς,
τῆς κραταιᾶς τε προυσσιακῆς βασιλείας ἐξ ἀπορρήτων,
τῆς τε ἰατρικῆς καὶ φυσικῆς φιλοσοφίας διδακταίου δημοσίου,
καὶ τῆς καιταρικῆς ἀκαδημίας τῶν περὶ τὰ φυσικὰ
ἐναχολουμένων προέδρου, κ. τ. λ.

^{εἰς τὸ νομίμως}
ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΒΑΘΜΟΝ ΑΝΑΒΙΒΑΣΜΟΥ

Τῶν τε τοῖς ἰατροῖς τιμῶν καὶ ἐλευθεριῶν
ἀμα δέ καὶ προνομίων, ἔθει ἀρχαίῳ, ἐπιτυχεῖν,

ἔπει αὖτις γαμηλιῶνος ἐπὶ ἱσταμένου
δημοσίου διαλεχθήσεται

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΣΗΣ

Σατιστέυς Μακεδών.

Ἀθήνησι Σαλικάϊς
Τύποις Σχνεϊδέρου

62
DE
VENAE SECTIONE
IN FEBRIBVS ACVTIS MALIGNIS
NON SEMPER NECESSARIA

E DECRETO

AMPLISSIMI MEDICORVM ORDINIS
IN REGIA FRIDERICIANA

PRAESIDE

VIRO ILLVSTRI EXCELLENTISSIMO ET EXPERIENTISSIMO
D. ANDREA ELIA BÜCHNERO

SACRI ROMANI IMPERII NOBILI,
POTENTISSIMI PRUSSIAE REGIS A CONSILIIS INTIMIS,
MEDICINAE ET PHILOSOPHIAE NATVRALIS PROFESS. PVBL. ORDINAR.
FACVLT. MEDICAE SENIORE ET REGIORVM ALVMNORVM EPHORO,
IMPERIALIS ACADEMIAE NATVRAE CVRIOSORVM PRAESIDE,
ET COMITE PALATINO CAESAREO,

PRO GRADV DOCTORIS

SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS AC PRIVILEGIIS
MORE MAIORVM LEGITIME CONSEQVENDIS

DIE XVI OCTOBVIS MDCCCLX.

PVBlice DISPVTABIT

AVCTOR

DEMETRIVS NICOLAI KARAKASSES

SATISTA - MACEDO.



HALAE AD SALICAM,
STANNO SCHNEIDERIANO.



DISSERTATIO INAUGVRALIS MEDICA

DE

VENAE SECTIONE IN FEBRIBVS ACVTIS MALIGNIS NON SEMPER NECESSARIA.

ΠΡΟΟΪΜΙΟΝ.

Οὐδὲν τῷ ὄντι σαφέστερον οὐδεμὴν ἀληθέστερον τοῦ ἱατρικῆς ἐκείνης ἀξιώματος, ὅτι ἔχ ἀπλῶς ἀλλὰ λίαν περισκεμμένως ἐν τῷ θεραπεύειν τοῖς κενωτικοῖς χρῆσθαι δεῖ βοηθήμασιν. Ἐδίδαξεν ἤδη τῷτο ἐν πολλοῖς μὲν τῶν ἐαυτῆς συγγραμμάτων ὁ μέγας ἐκεῖνος Ἱπποκράτης ὁ τῶν ἱατρῶν κορυφαῖος. Πρὸς τοῖς ἄλλοις δὲ τοῖς παρ' αὐτῆς εἰρημένοις, τῷ προκειμένῳ τῷτῳ

PRAEFATIO.

Nihil plane certius est ista veritate medica, quod non promiscue, sed summa cum circumspectione in morbis persanandis adhiberi debeant remedia evacuantia. Docuit id iam compluribus in locis Operum suorum Magnus HIPPOCRATES, Medicorum facile princeps. Huic argumento, inter alia eius effata, respondent quoque

fequentia: Sic & vasorum evacuationio, si quidem, qualem fieri decet, fiat, confert, & facile ferunt; sin minus, contrarium fit. Respicere igitur oportet & regionem, & tempestatem, & aetatem, & morbos, in quibus convenit aut non (Aph. 2. Sect. I). Porro: Incipientibus morbis, si quid movendum videatur, move: vigentibus vero quiescere melius est (Aph. 29. Sect. II). Sicuti vero omnia generatim evacuantia hanc prudentiam a Medico exigunt, ut illorum applicationem cum salute aegrotantium facere sciat; ita praefertim opus erit, ut idem circa Venae sectionem in febribus acutis malignis observetur. Exemplis multorum Medicorum mihi constitit, quod ab ipsis Venae sectio in febribus modo dictis sine ullo discrimine institui soleat, non fecus, ac si istud remedium ad curandos aegrotantes summæ necessitatis foret; cuius

λόγω, μάλιστα συμφωνεῖ τὰ ἐπόμενα: Οὕτω δὲ καὶ ἡ κενεαγγεῖα, ἣν μὲν οἷα δεῖ γίνεσθαι γίγνοιτο, συμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσιν; ἣν δὲ μὴ, τὸναντίον. Ἐπιβλέπειν δὲ δεῖ καὶ χῶρην, καὶ ὥρην, καὶ ἡλικίην, καὶ νόσους ἐν ἡσὶ δεῖ ἢ ὄχι (Τμήμ. α. ἀφορ. β). Καὶ αὖθις: Ἀρχομένων τῶν νόσων ἡντι δοκέει κινέειν, κίνει: ἀκμαζουσῶν δὲ, ἡσυχίην ἔχειν βελτίον ἐστὶ (Τμήμ. β. ἀφορ. ηθ.). Καθάπερ δὲ πάντα, ὡς ἐν γένει εἰπεῖν, τὰ κενωτικὰ βοηθήματα ταύτην παρὰ τῶ ἱατρῶ τὴν φρόνησιν εἰσπράττονται ἵνα ἐπὶ μεγίστῃ τῶν καμνόντων ὠφελείᾳ χρῆσθαι τέτοις γινώσκῃ, ὅτω δὴ μάλιστα αὐτὸ τέτοιο περὶ τὴν φλεβοτομίαν ἐν τοῖς ὁξέσιν ἅμα καὶ κακοήθεσι πυρετοῖς παρατηρεῖσθαι ἄξιον. Ἐν οἷδα ἱκανοῖς τε παραδείγμασι πέπεισμαι, ὅτι πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἐν τοῖς ἤδη ῥηθεῖσι πυρετοῖς ἄνευ τινὸς διακρίσεως παραλαμβάνειν τὴν φλεβοτομίαν εἰώθασιν, ὅχι ἥττον, ἀλλ' ὥσαντι τὸ βοήθημα εἰς τὴν τῶν καμνόντων ἰασιν τῶν ἀναγκαιοτάτων ὑπῆρχεν;

ἔτινος γεμὴν τὴν χρῆσιν περιορίσαν
 πως εἶναι ὃ, τε λόγος καὶ ἡ πείρα πε-
 ρῶσιν. Ὁ δὲ ἐκ τῆς παρόντος συγ-
 γραμματὶς σαφέστερον δηλωθήσεται,
 ἐν ᾧ ἰχυροῖς λόγοις ἀποδείξαι πειράσο-
 μαί, τὴν φλεβοτομίαν ἐν τοῖς ὀξέσιν
 αἵμα καὶ κακοήθεσι πυρετοῖς ἐκ αἰ-
 νάγκαιαν εἶναι.

§. α΄.

Διδάσκουσι μὲν οἱ παθολογοῦν-
 τες ἐπικυρῆσαι δὲ τῆτο καὶ αἱ παρατη-
 ρήσεις, ὑπάρχειν τινὰ νοσήματα, ἃ τῇ
 τῶν ἰδίων ἀναθυμιάσεων ἐτέρῳ ἡνι-
 ὑποκειμένῳ, ἄλλως ὑγιαίνοντι, κοινωνῶν,
 ὁμοιον ἑαυτοῖς νόσημα ἐν ἐκείνῳ προσ-
 διορίζαι δύνανται. Τῆτό τε ἐν ἐκείνῳ
 πάντως γε προσδιορίζεσθαι, ἢν μὴ
 παρῶσιν, ἢ φθάσαντα πρότερον, ἢ
 αὐτίκα μετὰ τὴν ὑποδοχὴν τῶν ἀνα-
 θυμιάσεων προτενεχθῶσι τὰ τὴν τῆ
 δηλητηρίαν δύναμιν συντρέψαι ἰσχύοντα.
 Κακοήθει τὰ τοιαῦτα καλεῖται νο-
 σήματα. Ἐκ τῶν παρατηρήσεων δ'
 αὐθις πρόδηλον, τὰ κακοήθει ταῦτα
 νοσήματα ἐνίοτε μὲν ταχέως ἀποτερ-
 τίζεσθαι, εὐθέως τε ἐπικείμενον τοῖς
 νοσῶσιν ἐπιφέρειν κίνδυνον. ἄλλοτε δὲ

ius tamen usum restringendum esse
 volunt ratio & experientia. Quod
 iam ex præsentī Dissertatione publi-
 ca apparebit, in qua solidissimis ar-
 gumentis probare conabor, Venæ
 sectionem in febribus acutis mali-
 gnis non semper necessariam esse.

§. I.

Docent Pathologi, idque obser-
 vationes confirmant, morbos existe-
 re, qui, exhalationibus suis cum
 alio subiecto, alias sano, communi-
 catis, sui similem morbum in illo
 determinare possunt; illumque in
 eodem re vera determinari, nisi vel
 adsint, vel præmittantur, vel post
 susceptas exhalationes statim offe-
 rantur quæ vim & potentiam vene-
 ni infringunt. Morbi huius con-
 ditionis dicuntur *maligni*. Ex ob-
 servationibus porro elucescit, morbos
 malignos nonnunquam celeriter de-
 cursum suum absolvere, statimque
 stipari eminenti periculo vitæ ægro-
 tantium; quandoque autem phæno-
 mena,

mena, hisce plane contraria, in conspectum dare. Quum ergo Pathologi priores morbos *acutorum* seu *brevium*; posteriores autem *chronicorum* sive *longorum* nomine insignire soleant: distinctio morborum in acutos & chronicos firmo innitur fundamento.

§. II.

Morbus malignus requirit morbum, qui exhalationibus suis sui similem morbum in alio subiecto excitare valet (§. anteced.). Quum hoc phaenomenon reapse determinatum sine ingressu particularum quarumdam ex uno corpore in aliud concipi nequeat, & partes corporis humani vel solidæ sint, vel fluidæ; solidæ vero, qua tales, nunquam exhalationum instar dissipantur (per princip. physiolog.): necesse omnino est, ut morbus malignus, sui similem morbum producens, requirat, ut particulae fluidorum e corpore, hoc morbo afflicto, egrediantur, atque in aliud corpus defe-

τ'αναντία τέτοις δεικνύναι φαινόμενα. Ἐπεὶ τοίνυν οἱ παθολογῶντες ἐκεῖνα μὲν, ὀξεία ἢ βραχέα, ταῦτα δὲ, χρόνια ἢ μακρὰ ὀνομάζειν εἰώθασιν: ἢ τῶν νοσημάτων ἄρα εἰς ὀξεία καὶ χρόνια διαίρεσις βεβαίως ἐπερείδεται θεμελίως.

§. β'.

Τὸ κακότηδες νόσημα τοῖον δέ τι ἀπαιτεῖ νόσημα, ὃ ταῖς ἰδίαις ἀναθυμιάσεσιν ὅμοιον ἐαυτῷ πάθος ἐν ἐτέρῳ ἢ ἐν ὑποκειμένῳ ἀνεγείρει δύναται (§. α). Ἐπεὶ ἔν τὸ φαινόμενον τῷ το κυρίως προσδιορισθὲν ἄνευ παρεισδύσεως μορίων τινῶν ἀφ' ἐτέρου εἰς ἕτερον σῶμα ἐννοηθῆναι ἀδύνατον, τὰ μέρη δὲ τῷ ἀνθρώπινῳ σώματος ἢ τερεῶ ἐσιν ἢ ὑγρά, τὰ ὑγρά δὲ ἢ τοιαῦτα ἐδέποτε ἀναθυμιάσεων δίκην περιδιαχέονται (κατὰ τὰς φυσιολογικὰς ἀρχάς): ἀνάγκη δὴ πρὸς τὸ ἀποτελέσαι ὅμοιον ἐαυτῷ πάθος τὸ κακότηδες νόσημα ἀπαιτεῖν, ἵνα τὰ μόρια τῶν ὑγρῶν ἐκ τῷ πάσχοντος ἤδη σώματος ἐξιόντα εἰς ἄλλό τι σῶμα εἰσρεύωσι, ἐπεὶ δὲ πᾶν αἰτιατὸν ἀνάλογον ἐαυτῷ ἀπαιτεῖ αἰ-

τιον, ἀπὸ τῆς ἰσότητος δ' αὖθις τῶ αἰ-
τιατῶ εἰς τὴν τοῦ αἰτίου ὑγιᾶς τὸ συμ-
πέρασμα, ὡς παρὰ τοῖς φιλοσόφοις
ἀποδείκνυται; ἀπὸ τῆς παρεισδύσεως
δὲ τῶν μορίων τέτων τὸ αὐτὸ νόσημα,
ὅπερ ἐν τῷ νοσῶντι ἤδη σώματι, πά-
ρῃσι (κατὰ τὴν ὑπόθεσιν): ἀνάγκη,
ἵνα τὰ μόρια ταῦτα τὰ τῷ ἐτέρῳ
σώματι ἐγκολπωθέντα τὰς αὐταῖς
ταῖς ἐν τῷ ὑποκειμένῳ παρῃσαις, ἐξ ὧ
τὸ προσληφθὲν πάθημα παρήχθῃ,
διαθέσεις ἀποτελέσωσιν. Αἱ ἄρα
ἀπὸ τῶν προσληφθέντων μορίων με-
ταβολαὶ τῆς ὑγιᾶς πορῶν διεσῆκασιν
καταστάσεως. Διὸ δὴ ἔδ' ἐν δέχεται
τὰ τοιαῦτα τῶν ὑγρῶν μόρια ἔως
ἔχειν, ὡς ἡ ὑγιᾶς τοῦ ἀνθρωπίνου σώμα-
τος εἰσπράττει κατάστασις. Ἀλλάγε
τὰ τῶν ὑγρῶν πάθη ἀπαιτῶσιν ἵνα ἡ
ἡποσότης αὐτῶν, ἡ ἡ ποιότης, ἡ ἡ μίξις,
ἡ ἡ κίνησις ἀπὸ τῆς ὑγιᾶς ἐκτραπῇ
καταστάσεως. Ἡ πληθώρα δὲ καὶ ἡ
τῶν ὑγρῶν ἀνάξεις, ἡ κενεαγγεία τε
καὶ ἡ βραδεία τῶν ὑγρῶν κίνησις ἔδ' ἐ-
ποτε τὴν τῶ κακαήθους νοσήματος πα-
ρεῖσιν φύσιν παρατηρῶνται. Τὸ κα-

deferantur. Quoniam vero quili-
bet effectus proportionatam sibi vin-
dicat causam, ex æqualitate effe-
ctus porro ad æqualitatem causæ
consequentia valet, perhibentibus id
Philosophorum demonstrationibus; at-
que ab ingressu harum particula-
rum idem morbus præsens est in
corpore iam ægrotante (per hypo-
thes.). opus est, ut particulæ istæ,
alterius corpori insinuatæ, easdem
producant determinationes, quæ de-
prehenduntur in subiecto unde su-
sceptus morbus derivandus venit.
Mutationes ergo, a particulis re-
ceptis productæ, a statu sanitatis ab-
errant. Neque ideo fieri potest, ut
huiusmodi particulae fluidorum ta-
lem conditionem habeant, qualem
iam status sanitatis in corpore hu-
mano sibi vindicat. Enim vero
morbi fluidorum requirunt, ut ho-
rum vel quantitas, vel qualitas, vel
mixtio, vel motus a statu sanitatis
declinet. Plethora porro, ebullitio
humorum, motus fluidorum iusto tar-
dior,

dior, indolem morbi maligni nunquam exhibere observantur. Quare morbus malignus mixtionem humorum depravatam postulabit; sed mixtio humorum per motum intestinum depravatur: Hinc morbus malignus cuiuscunque indolis (§. anteced.) supponit motum intestinum, quatenus mixtionem fluidorum corporis humani destruentem, adeoque modo fermentationem, modo putrefactionem, quæ summum fermentationis gradum sive absolutam fermentationem constituit (per princ. chem.). Unde colligitur, in humoribus corporis, quod morbo cuidam obnoxium est, putredinem adesse debere. Ubi vero caussa efficiens adest sufficiens, ibi eiusdem effectus esse debet. Quum porro putrefactio scaturigo sit putridi, non poteris dubitare, quin morbi maligni putridum, in humoribus nostris latitans, requirant.

§. III.

Quidquid efficit, ut morbus quidam sit is, qui est, illud caussa eius-

κόηθες ἄρα νόσημα τῆς μίξεως διαφθορὰν ὑποτίθουσιν. Ἀλλ' ἡ τῶν χυμῶν μίξις διὰ τῆς ἐνδομύχου λυμαίνεται κινήσεως. Τὸ κακὸν κακὸν νόσημα ὁ ποῖος δὴποτε φύσεως (§. ἀνωτ.) ἐνδόμυχον ὑποτίθουσιν κίνησιν κατ' ὅσον τὴν μίξιν τῶν ὑγρῶν τῶ ἀνθρώπινου σώματος διαφθείρουν: καὶ δὴ νῦν μὲν ζύμωσιν, νῦν δὲ σήψιν, ἥτις τὴν ἐς ἄκρον ἦτοι ἐντελῆ συνίστησι ζύμωσιν (κατὰ τὰς χημικὰς ἀρχάς). Ὅθεν συνάγεται ἐν τοῖς χυμοῖς τῶ σώματος τῶ κακὸν κακὸν νόσηματι εἶναι ἐκτενέστερον. Ὅπως δὲ τὸ ποῖον αἴτιον ἀποχρῶν, ἐκεῖ καὶ τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα, ἡ σήψις δὲ τῶ σηπεδονώδους ἐστὶ πηγὴ, δῆλον ὅτι τὰ κακὸν κακὸν νόσηματα σηπεδονώδεις τι τοῖς ἡμετέροις χυμοῖς ἐμφωλεῦον ἀπαιτεῖ.

§. γ'.

Πᾶν τὸ ποῖον τὸ παθήματός τι-
νος τί ἦν εἶναι, τὸ αἴτιον τῶ αὐτοῦ

ὑπάρχειν ὀφείλει: ἀλλὰ μὲν τὸ ἐν τοῖς
 χυμοῖς σηπεδονῶδες ἀπεργάζεται, ἵνα
 τὸ κακότηδες νόσημα ὁμοιον ἑαυτῷ ἐν
 ἄλλῳ ἴσῃ ὑποκειμένῳ προσδιορίσῃ
 (§. ἀνωτ.), ἄρα ἵνα ἡ κακότηδες νόσημα
 (§. α.). ἔκδῃ τὸ ἐν τοῖς τῷ ἀνθρώπινῳ
 σώματι. χυμοῖς ἐνυπάρχον σηπεδονῶ-
 δες, αἰτία ἔσαι τῶν κακοτήτων νοσημά-
 των. Ἀπὸ τῆς ὑπάρξεως ἄρα τοῦ
 κακοτήτους νοσήματος εἰς τὴν τῷ σηπε-
 δονῶδες, καὶ ἀπὸ τῆς τέτῃ εἰς τὴν
 ἐκείνῃ ὑπαρξίν ἐξίσῃ ὑγιῆς ἔσαι ἡ ἀκο-
 λυθία. Ἐντεῦθεν ἀπὸ τῆς φύσεως
 τῶν εἰσπνεόντων ἀγγείων αἱ πανταχῶς
 τοῦ ἀνθρώπινου διέσπαρται δέρματος,
 καὶ ὁ τῷ μολυσμῷ σαφηνίζεται τρόπος,
 ὑγρῶν τε τινῶν ἢ κυριωτάτῃ μόλυν-
 σις, καὶ τόπων τινῶν ἢ ταχίσῃ κάκω-
 σις. Ἔστι δὲ ἡμῖν ἐνταῦθα περὶ τῶν
 προσεχῶν αἰτίων τῶν κακοτήτων νοση-
 μάτων ὁ λόγος, ὧν τὰ πόρρω αἰτία,
 ποικίλα, ἐξαιρέτως δὲ αἰφθοραὶ τῶν
 ἐξ μὴ φυσικῶν καλεσμένων.

§. δ.

Οἱ χημικοὶ περὶ τῆς ἐνδομύχῃ
 κινήσεως, ὡς ὑγρῶ τινος τὴν μίξιν ἀνα-

eiusdem esse debet. Sed putridum,
 quod iam inhæret massæ humorum,
 efficit, ut morbus malignus determi-
 net sui similem morbum in alio subie-
 cto (§. anteced.), ergo ut sit morbus
 malignus (§. I). Hinc putridum, quod
 humoribus corporis humani inexistit,
 causa esse debebit morborum maligno-
 rum. Ex præsentia itaque morbi ma-
 ligni ad præsentiam putridi, atque ex
 huius ad illius præsentiam æque vale-
 bit consequentia. Inde etiam ex natu-
 ra vasorum absorbentium, per corti-
 cem externum corporis humani disper-
 forum, patet modus contagii; fluido-
 rum quorundam præcipuum inquinam-
 entum; locorum quorundam præ-
 ceteris afflictio. Loquor hic de mor-
 borum malignorum causa proxima,
 cuius causæ remotæ variæ possunt esse,
 præcipue vitia rerum fex non-natura-
 lium.

§. IV.

Chemici de motu intestino, mix-
 tionem fluidi cuiusdam destruyente,
 B 2 disse-

differentes, duos præcipue observari eiusdem gradus evincunt, priorem densitatem fluidi, posteriorem illius rarefactionem sibi coniunctam habere; illum lente, hunc longe citius absolvi. Quod quum de quolibet fluido valeat, valebit etiam de fluido corporis humani, ubi iam tyrannidem suam exercet putredo. Quoniam autem quilibet putredinis gradus sine alcali volatilis productione cogitari nequit, prouti Chymia docet: necesse est, ut primo in gradu sal alcalinus magis implicitus inhæreat humoribus, & magis sit explicitus in putrefactionis gradu secundo. Hinc putredo suscitata in massa humorum corporis humani modo potentius, modo debilius agere debet.

§. V.

Morbus malignus vel acutus est, vel chronicus (§. I.); uterque putridum in humoribus corporis humani requirit (§. II.) tanquam sui causam (§. III.).

τρεπῆσης, τὸν λόγον ποιῶμενοι, διττὸν μάλιστα αὐτῆς παρατηρεῖσθαι πείθῃσι τὸν βαθμὸν, τὸν μὲν τῇ τῷ ὑγρῷ πυκνώσει, τὸν δὲ τῇ τῷ αὐτῷ ἀραιώσει συνευγμένον, ἐκεῖνον μὲν ἡσυχῇ, τῷτον δὲ πολλῷ τάχῳ ἀποτελεῖσθαι. Ὁ δὲ ἔπει ἀληθεύεται ἐπὶ ἐκάστῳ ὑγρῷ ἀληθεύσεται ἄρα καὶ ἐπὶ τοῦ ὑγροῦ τῷ ἀνθρώπινῳ σώματος, ἐπικρατέσης ἤδη ἐν αὐτῷ τῆς σήψεως. Ἐπεὶ δὲ ἕκαστος τῆς σήψεως βαθμὸς ἀνευ τῷ δυσώδῳ τι προαγαγεῖν ἀλυκὸν πνεῦμα ἐννοεῖσθαι ἔδύναται, ὡς ἡ χημικὴ διδάσκει: ἀνάγκη ἵνα ἐν τῷ πρώτῳ βαθμῷ τὸ ἀλυκὸν τῷ πνεύμα συνεπτυγμένον τοῖς χυμοῖς ἐνιζάνῃ, ἀνεπτυγμένον δὲ μᾶλλον ἐν τῷ δευτέρῳ βαθμῷ τῆς σήψεως. Ὅθεν ἡ ἐν τοῖς χυμοῖς τῷ ἀνθρώπινῳ σώματος ἀνεγερεῖσθαι σήψις, νῦν μὲν ἰσχυρότερον, νῦν δὲ ἀσθενέστερον ἐνεργεῖν ὀφείλει.

§. Ε.

Τὸ κακὸν νόσημα ἢ ὀξύ ἐστίν, ἢ χρόνιον (§. α.); ἐκάτερον σηπεδονῶδες τι απαιτεῖ ἐν τοῖς χυμοῖς τῷ ἀνθρώπινῳ σώματι (§. β') ὡς ἴδιον αἷτιον (§. γ'). διὸ

τὸ κακὸν θες ὅξυ νόσημα ἀπαιτεῖ ση-
πεδονῶδες ἐξ ἑαυτῆς προβαίνει κινδύ-
νῶδες νόσημα ταχέως τε ἀποτερματέ-
μενον (§ β.); ἀλυκὸν ἄρα πνεῦμα τῇ
τῶν χυμῶν ἀραιάται συνεζευγμένον
(§. ἀνωτ.). Τῷ ὅξει κακὸν θες νόσηματι
ἀντίκειται τὸ χρόνιον κακὸν θες (§. α.):
ἐκ τούτου καὶ τὸ τέττατον αἴτιον σηπεδονῶδες
ἔσται, ἡσυχέστερον ἔμπης καὶ ἀσθενέστερον
ἐνεργῶν, καὶ διὰ ταῦτα ἀλυκὸν πνεῦμα
τῇ τῶν χυμῶν συνημμένον πυκνῶται.

§. 5.

Εἰπὼν ἅττα τῶν κακῶν νόση-
μάτων ὡδέπως προβαίνοντα. Τοῦ
περιφερικοῦ σπασμοῦ, ὅτε μὲν μείζο-
νος, ὅτε δὲ ἐλάττονος, περίπου ἐσπέρας
ὀσημέραι, εἰσβάλλοντος, τῶν σφυγμῶν
παρατηρεῖται ταχύτης τε καὶ πυκνότης.
Παρά ταῦτα δὲ μικρός, πολλακίς καὶ
ἀμυδρὸς καταλαμβάνεται ὁ σφυγμός.
Τῷ σπασμῷ δὲ τέττατον ἀνίσχοντος ἢ τε
θλίψις τῶν προκαρδίων καὶ ἡ τῶν δυνά-
μεων ἀποβολὴ αὖξονται, συντρέχουσι
τε καρδιαία, κεφαλῆς τε ὀδύνη καὶ
ιλυγγωδεῖς κακώσεις, λειποθυμία,

(§. III.) Quare morbus malignus postu-
lat putridum, a quo morbus proficisci-
tur statim periculosus, celerisque decur-
sus (§. II); hinc alcali volatile cum
massæ humorum rarefactione coniun-
ctum (§. anteced.). Morbo maligno
acuto opponitur morbus malignus
chronicus (§. I): unde etiam causa
eiusdem erit putridum, quod vero
lentius & debilius agit, ideoque al-
cali volatile cum inspissatione flui-
dorum coniunctum.

§. VI.

Dantur morbi maligni, qui se-
quenti modo incedunt. Post spas-
mum periphericum, modo maiorem,
modo minorem, circa vesperam, quo-
vis die ingruentem, pulsuum obser-
vatur celeritas; præterea vero par-
vus sæpiusque obscurus deprehendi-
tur pulsus. Spasmo illo suborto, an-
xietas præcordiorum viriumque pro-
stratio increascunt, concurrunt capitis
gravitas, neque deficiunt eiusdem do-
lores, vertiginosæ afflictiones, lipo-
thymia, lapsus memoriæ, deliria,

vigiliæ, affectus soporosi, convulsiones. Aestus, quem sibi comitem habent morbi isti, satis est moderatus. Æger se melius habere videtur horis matutinis, quam vespertinis. Ad decursum suum absolvendum interdum ne unicum quidem septenarium requirunt, tertium raro superant. Solvuntur vel per redeuntem sanitatem, vel per alium morbum, vel per mortem. Ultima solutio erit pessima.

§. VII.

Morbi maligni, in §. anteced. adumbrati, facta sui exacerbatione invadunt cum spasmō peripherico, quem pulsus celer & frequens subsequitur; quam ob rem necesse erit, ut istis quoque morbis notio febris æque vera sit ac fœcunda (a). Sed huius iam conditionis esse deprehenditur febris in morbis ad §. anteced. descriptis, ut celeriter decurrat, statim stipata eminente quodam periculo vi-

tæ

μνήμης ὀλίσθος, παραφροσύναι, ἀγρύπνιαι, καρῶδη παθήματα, σπασμοί. Ἡ παρεπομένη δὲ τοῖς νοσήμασι τέτοις θερμότης ἔπαρὰ πολὺ τῷ μέτρῳ ἐκπίπτει. Ὁ δὲ κάμνων εὐφορώτερον ἔχειν καθορᾶται ταῖς ἐωθιναῖς ἢ ταῖς πρὸς ἑσπέραν ὥραις. Ἐἰς τὸ ἀποπερατῆσθαι δὲ ἔδὲ τῆς ἐβδόμης ἐστὶ ὅτε δέοντα, σπανίως τε τὴν καὶ ὑπερβαίνουσι. Λύοντα ἢ δι' ἐπανελεύσεως τῆς υγιείας, ἢ δι' ἄλλου νοσήματος, ἢ διὰ θανάτου, ἢ ἐσχάτη λύσις κακίστη.

§. Ζ'.

Τὰ κακοήθη νοσήματα, ὡς §. ἀνωτ. ἐσκιαγράφοντα, παροξυνόμενα μετὰ περιφερικῶν σπασμῶν ἐισπιδῶσι, μεθ' ὧν σφυγμὸς παρομαρτεῖταχύς τε καὶ πυκνός; διὸ ἀνάγκη ἵνα καὶ τέτοις ἀγρύπνη ὁ τοῦ πυρετοῦ ὁρισμὸς ἐκείνῃς ἀληθείας ὦν. Ἀλλὰ τοιαῦτα καταστάσεώς ἐστιν ὁ ἐν τοῖς ἀνωτ. §. διαγραφείσι νοσήμασι πυρετός, ᾧτε ὁξύρροπος ὦν αὐτίκα τε ἐπιφέρων τῷ νοσῶντι τὸν κίνδυνον: ὅτι ἄρα ὁ πυρε-

(a) Egregie id demonstravit excell. atque exper. Dn. D. ΝΙΕΤΖΚΙ, vir ad amplificandam augendamque medicinam plane natus, in Dissertat. inaug. de *Febris complicatis*. Hal. 1753.

τὸς ἔτος ὁξὺς, ἀναμφίβολον, ἔχῃ ἥτον δὲ, καὶ ὅτι συνεχῆς ἅμα ὁ αὐτὸς, ὡς τὰ ἀνωτέρω διδάσκει, δια δὴ τὰ τέτα συμπτώματα ἐν τῷ καιρῷ τῆς παντελὲς αὐτῆς λύσεως παρατηρεῖται μείζονα. Ἐξ ὧν ἀπάντων νυνὶ συμπερανεῖν ἡμῖν ἔξεστιν, ὑπάρχειν τινὰ πυρετὸν συνεχῆ καὶ ὁξὺν τῆς κακότητος νοσήματος τὴν φύσιν παριστάνοντα, ὅστις διὰ ταῦτα πυρετὸς κακότητος, ἢ νόσημα ὁξὺ καὶ κακότητος δικαίως τε καὶ εἰκότως προσαγορεύεται.

§. II.

Πᾶν κακότητος νόσημα σηπεδονώδες τι τοῖς τῆς ἀνθρωπίνης σώματος χυμοῖς ἐνιζάνον ἐισπράττει (§. I.). ἢ σηπεδονώδης αὕτη ὕλη εἶγε ὁξὺ τὸ κακότητος νόσημα, τῇ τῶν ὑγρῶν, οἷς ἐμφωλεῖται, ἀραιώσει συνέζευσται (§. I.). Οἱ κακότητος ἄρα πυρετοὶ ἀπαιτῶσιν ἀλυκόντι πνεῦμα ἐν τοῖς ἀραιωθεῖσι χυμοῖς περιφερόμενον (§. I. εἰ καὶ ζ'). ἐπικυρῶσι τὴν κρίσιν ταύτην τὰ συμπτώματα, ἢ γένεσις, τὸ ἐκκρινόμενον αἷμα, τὰ νεκρὰ σώματα, τὸ μετὰ

tæ ægri. Quin igitur ista febris acuta sit, dubitari non poterit. Neque minus idem §. docet, hanc febrem continuam simul esse debere, utpote cuius symptomata intra tempus plenariæ suæ solutionis imminui observantur. Ex quibus omnibus nunc iam conficere licebit, existere febrem continuam, acutam, indolem morbi maligni præ se ferentem, quæ ideo *febris maligna*, aut *morbus acutus malignus* iure meritoque dicitur.

§. VIII.

Quilibet morbus malignus putridum humoribus corporis humani inhærens sibi vindicat (§. II.). Putrida hæc materia, si acutus fuerit morbus malignus, cum rarefactione fluidorum, in quibus latitat, coniuncta esse debet (§. V.). Hinc febres malignæ requirunt, ut in rarefacta massa humorum alcali volatile oberret (§§. V. & VII). Iudicium hoc confirmant symptomata, origo, sanguis excretus, corpora demortua, ex-

perimentum cum acido vitriolico factum (b).

§. IX.

Locus hic esset, de symptomatibus, quibus stipatae incedunt febres malignae, eorumque causis differendi. Hæc vero lubens omitto, ut & ea, quæ ad causas febrium malignarum plenius cognoscendas pertinent. Cui vero interest, huius argumenti fructuosam cognitionem sibi facili negotio comparare, ille consulat experientiss. Dn. D. LVDOLFF l. c. Magis vero nunc cum scopo meo conveniet, de istarum febrium *solutionibus* quædam dicere.

§. X.

Quod si morbus quidam, qui corpori humano inhæret, desinat ipsi existere, illum tunc solutum esse Medici dicunt. Morbus itaque solutus supponit causam morbi inefficacem redditam respectu corporis ægri. Unde

τῆ πνευματώδους τοῦ χαλκάνθους ὀξέος πείραμα.

§. Θ'.

"Εδει ἂν ἡμῖν ἐνταῦθα τὸν ὑπὲρ τῶν συμπτωμάτων, οἷς οἱ κακοήθεις περιστοιχίζονται πυρετοί, καὶ τῶν αἰτιῶν αὐτῶν διεξελθεῖν λόγον. Ἀλλὰ ταῦτα τε καὶ ὅσα πρὸς ἐντελεστέραν τῶν αἰτιῶν τῶν κακοήθων νοσημάτων φέρει γινώσκιν, ἀσμένως παραλιπεῖν ἀξιῶ. Ἐξὸν τῷ βελομένῳ ἐντελεστέραν ἵνα περὶ τέτων κτήσασθαι γινώσκιν τὰ τῷ λυθόλφῳ συγγραφέντα ἀναγινώσκειν. Περὶ τῶν λύσεων δὲ τῶν πυρετῶν τέτων, ὡς τῷ ἡμετέρῳ σκοπῷ μᾶλλον οἰκιοτέρων, ταυτὶν διελεύσομαι.

§. ι'.

Τῆς ἐνυπαρξέως νοσήματος τινος τῷ ἀνθρώπινῳ σώματι προσφυνέτος ἀναιρεθείσης, λυθῆναι τῆτο τὸ νοσημα παρ' ἰατροῖς λέγεται. Τὸ λυθὲν τοιγαρὲν νοσημα μηκετι ἐνεργῶσαν τῷ νοσῶντι σώματι τὴν τῆ νοσήματος ὑπο-

de

(b) Recensuit hoc experientiss. D. D. LVDOLFF in Diss. inaug. de Impedimentis circa solutionem febrium, &c. Hal. 1758.

τίθῃσιν αἰτίαν, διὸ λυθέντων τῶν πυρετῶν ἔκτι ἐνεργεῖ ἢ σηπεδονώδης ὕλη τῷ κάμνοντι. Ὅπως ἡ ἐμπεριεχομένη τῷ σώματι αὕτη ὕλη ἢ ἐντὸς αὐτῆς μένει, ἢ ὄχι: εἰμὲν τὸ δεύτερον, ἐκκέκριται ἤδη τῷ σώματι εἰ δὲ τὸ πρῶτον, ἔτι μετατραπήσεται ὡς μηκέτι ἢ σηπεδονώδης, ἢ ἢ τῷ πρότερον πάσχοντος ὑποκειμένου κατάστασις ἔτι μεταβληθήσεται, ὡς ὅτι ὑγίεια ἔτι ἔδεμὴν νόσημα κατ' αὐτῆς λέγεσθαι δύναται. Σαφεῖς ἐντεῦθεν οἱ τρόποι καθ' ὃς ἢ τῶν κακοήθων πυρετῶν λύσις γίνεται.

§. ΙΑ'.

Ἐπεὶ ἡ ὑγιεινὴ κατάσταση εὐκράτα ἔμην δὲ σεσηπότα ἀπαιτεῖ τὰ ὑγρά, ἐπεὶ αὐτὴς κατὰ τῷ νεκρῷ σώματι ἔδεν λέγεται νόσημα. καὶ τελευτῶν τὸ εἰς ἕτερον τελευτήσαν νόσημα μεταβληθεῖσαν ὑποτίθῃσι τὴν αἰτίαν (κατὰ τὰς παθολογικὰς ἀρχὰς), ἀνάγκη ἵνα ἢ τῷ κακοήθους πυρετῷ ἢ εἰς ὑγίαν, ἢ ἑτέραν νόσον, ἢ θάνατον μετατροπῇ (§. 5.) ἀληθῆς ἢ λύσις (§. ἀνωτ.). Ἡ ὑγίεια τὴν ἀκρὰν τῷ ἀν-

de febres malignæ solutæ requirunt, ut putrida materia effectus suos in ægrotantem exferere non possit. Quo in casu ista materia, in corpore inclusa, vel intra illud adhuc manet, vel non: si posterius, eliminari debet e corpore; si prius, ita mutata esse oportet, ut desinat esse putrida, vel status subiecti antea ægrotantis ita mutetur, ut de eo nec sanitas, nec morbus ulterius prædicari possit. Patent exinde omnes modi, quibus solutio febrium malignarum contingere potest.

§. XI.

Quum status sanitatis fluida blanda, non putrefacta, requirit; quum corpori mortuo nullus competere potest morbus; tandemque morbus per alium determinatus huius causam mutatam supponit (per princip. patholog.); necesse est, ut febris maligna mutata in sanitatem, aut alium morbum, aut mortem (§. VI), vere sit soluta (§. antec.). Sanitas summam corporis humani

D

con-

constituit perfectionem, eaque eo maior, eo præstantior est, quo plures functiones conspirant cum ultimo illo fine naturæ, qui nullus alius est, quam vitæ corporis conservatio; quapropter solutio febrium malignarum erit optima, quæ fit per redeuntem sanitatem, peior, quæ contingit per alium morbum, omnium pessima, quæ morte absolvitur.

§. XII.

Ex pathologicis constat, febrium malignarum solutionem vel successive, vel certo die quasi in instanti, adeoque vel per lysin, vel per crisin fieri. Sed lysis & crisis evenit modo per eccrisin, five excretionem materiæ febrilis, modo per metastasin, five translationem eiusdem ad certa corporis loca: Qua de causa febres malignæ modo per eccrisin, modo per metastasin solvuntur (§. X.).

§. XIII.

Solutiones febrium malignarum fiunt modo per eccrisin, modo per meta-

θρωπίνε σώματος συνίσησιν έντελέχειαν, αὕτη δέ τοσάτω μείζων τοσάτω τε βελτίων, ὅσω πλείους ἐνέργειαί τῷ σκοπιμωτάτῳ ἐκείνῳ τῆς φύσεως τέλει συμπνέουσιν, ὅπερ ἔδεν ἄλλο εἶμὴ ἢ τῆς τῆς σώματος ζωῆς συντήρησις. Ὅθεν ἢ τῶν κακοηθῶν πυρετῶν διαί τῆς ἀναλήψεως τῆς ὑγείας λύσις, καλλίστη, χείρων ἢ εἰς ἄλλό τι νόσημα, πατῶν κακίση ἢ εἰς θάνατον τελευτῶσα.

§. ΙΒ'.

Ἐκ τῶν παθολογικῶν πρόδηλον, τὴν τῶν κακοηθῶν πυρετῶν λύσιν ἢ κατὰ μικρόν, ἢ ὠρισμένην τινὶ ἡμέρᾳ ὄιον ἀθρόως γίνεσθαι, καὶ δὴ ἢ κατὰ λύσιν ἢ κατὰ κρίσιν. Ἀλλ' ἢ τε λύσις καὶ κρίσις, νῦν μὲν ἐκκρίσει, ἢτοι ἐκκενώσει τῆς τῆς πυρετῆς ὕλης, νῦν δὲ μετασάσει, ἢτοι μετακινήσει τῆς αὐτῆς εἰς τινὰς ὠρισμένους τόπους τῆς σώματος ἀποτελεῖται. Οἱ κακοήθεις ἄρα πυρετοί, ὅτε μὲν κατ' ἐκκρίσιν, ὅτε δὲ κατὰ μετάσασιν λύονται (§. Ι.).

§. ΙΓ'.

Αἰλύσεις τῶν κακοηθῶν πυρετῶν ἢ κατ' ἐκκρίσιν γίνονται, ἢ κατὰ μετά-

τασιν (§. ανωτ.), ἀλλ' ἡ μεταστάσις μετακίνησιν τῆς τῆ πυρετῆ ὕλης εἰς ὠριμένους ὑποτίθῃσι τόπους, ὡς ανωτ. εἴρηται, ὅθεν νόσημα, (κατὰ τὰς παθολογ. ἀρχάς), ὅπερ ἐκ ἀνήκει τῇ καλλίσῃ λύσει τῶν κακοηθῶν πυρετῶν (§. χ.). Ἀπασα ἄρα αἱ τῶν ὀξέων ἅμα καὶ κακοηθῶν νοσημάτων λύσεις αἱ μᾶλλον σωτήριοι κατ' ἐκκρίσεις ὀφείλῃσι γίνεσθαι. Ἐπεὶ δὲ τελάχιστον τῆ σηπεδονώδους μόριον νέαν ἀνεγείρει σήψιν φυράματι τινι ἔπω ταύτῃ συμπεφυρμένῳ, αὕτη δὲ ἔδὲν συμβαίνει πρὸς τὴν σωτήριον λύσιν (§. ια'). Ἀρα ἡ τὴν καλλίστην τῶν κακοηθῶν πυρετῶν λύσιν ἀποτελεῖσα ἐκκρίσις, ἔτω παρεσκευᾶσθαι ὀφείλει, ὡς ἂν ἅπαν ἐκκρινῶν τὸ σηπεδονώδες· ἡ αὕτη ἄρα ἐντελής ἔσται (κατὰ τὰς παθολογ. ἀρχάς).

§. ιδ'.

Ὅσω τάχιον ἡ ὑγίεια ἐπάνεισι, τοσάτω βέλτιον ὅθεν ἡ ἐκκρίσις ἐκείνη (§. ανωτ.) τοσάτω ἔσται βελτίων, ὅσω τάχιον δι' αὐτῆς ἀνακαλεῖται ἡ ὑγίεια. Ἐπεὶ ἐν τῇ ἐκκρίσει ἐκκένωσις τῆς τῆ

metastasin (§. ant.); sed metastasis supponit translationem materiæ febrilis ad certa corporis loca (§. citat); hinc morbum (per princ. patholog.), qui ad optimam solutionem febrium malignarum non pertinet (§. X). Quare omnes solutiones morborum acutorum malignorum maxime salutares per eccrises fieri debent. Quoniam autem minima particula putridi novam fuscitat putredinem in massa ab eadem adhuc libera, eaque non requiritur ad solutionem maxime salutarem (§. XI.); eccrises, determinans optimam febrium malignarum solutionem, ita comparata esse debet, ut omne putridum exterminetur; eandem itaque perfectam esse oportet (per princip. pathol.).

§. XIV.

Quo citius fanitas redit, eo melius erit; hinc eccrises illa (§. antec.) eo melior erit, quo citius per eandem fanitas impetratur. Quum ad eccrises requiratur excretio materiæ

febrilis (§. XII); excretiones vero in corpore humano differant ita, ut modo copiosius, modo parcius eliminetur fluidum, opus est ut eccripsis magis salutaris fiat per illam excretionem, quæ fluidum putredine infectum copiosissime e corpore educit. Verum excretiones supponunt translationem fluidorum excernendorum ad loca excretoria; hinc, quum fluida, per eccripsis e corpore eliminanda, in febribus malignis putrida sint (§. VIII), fieri potest, ut noxii effectus putridæ materiæ in eiusmodi locis producantur. Quare si eccripsis maxime salutarem febrium malignarum solutionem producere debet, non solum copiosæ excretiones, sed & minimo periculo stipatæ fiant, necesse est.

§. XV.

Copiosæ sanguinis excretiones magno fiunt cum vitæ periculo (per princ. patholog.). Hinc eccrisses maxime salutare in febribus malignis per hæmorrhagias fieri nequeunt (§. antec.);

πυρετῷ ἀπαιτεῖται ὕλης (§. β'); αἱ ἐκκρίσεις δὲ ἐν τῷ ἀνθρώπινῳ σώματι διαφέρουσιν, δια δὴ πλεῖον ἢ ἔλαττον τῷ πλήθει ἐκκρίνεσθαι τὸ ὑγρὸν. ἀνάγκη, ἵνα μᾶλλον ἢ σωτήριος ἐκκρίσις ἢ τὸ τῇ σήψει συμπεφυρμένον ὑγρὸν διαψιλέσθαι ἐκκεῖνται τῷ σώματι. Ἀλλ' αἱ ἐκκρίσεις ὑποτιθέασιν μετακίνησιν τῶν ἐκκριθησομένων ὑγρῶν εἰς τὰς ἐκκρίνοντας τόπους. ἐπεὶ δ' ἐν ταύτῃ ἐκκρίσιν ἐκκενωθησόμενα τῷ σώματι ὑγρά ἐν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς σιγηδονώδη ὑπάρχει (§. η'), ἐνδέχεται ἵνα ἡ σιγηδονώδης αὕτη ὕλη βλάβην ἐμποιήσῃ τοῖς τοιαύτοις τόποις. Ὅθεν ἡ τὴν σωτήριον τῶν κακοήθων πυρετῶν λύσιν ἀποτέλεσθαι ἐκκρίσις ὁ μόνον διαψιλῆς εἶναι ὀφείλει, ἀλλὰ δὴ καὶ ἀκίνδυνος.

§. ΙΕ.

Αἱ λαῦροι τῷ αἵματι ἐκχύσεις λίαν εἰσὶν ἐπικίνδυνοι (κατὰ τὰς παθολογ. ἀρχάς). διὸ σωτηρίως διατῶν αἱμορραγιῶν ἐκκρίσεις ἐν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς γενέσθαι αἰδύνατον

(§. ανωτ.) ἀλλὰ τὰ ἐκκριθιζόμενα ὑγρά ἐσιν ἢ αἷμα, ἢ διακεκριμμένα ἤδη ὑγρά· ὅθεν μᾶλλον σωτήριος ἐκκρίσις ἔσται ἐν τοῖς ὀξέσι καὶ κακοήθεσι πυρετοῖς ἢ διὰ τῶν διακεκριμένων ὑγρῶν συμβαίνουσα. Ἐπεὶ διὰ τῆς περιφερικῆς ἐκκρίσεως διακεκριμένον ἤδη ὑγρὸν ἐκκρίνεται· ἐπεὶ αὖθις ἀπασῶν τῶν ἄλλων ἐκκρίσεων τῶν τῷ αἵματι κεχωρισμένων ὑγρῶν αὕτη ὑπάρχει διαφιλεσάτη, καὶ περὶ διὰ τὴν κατασκευὴν τῷ δέρματι σμικρὸν τέτω ἢ σηπεδονώδης ὕλη ἐπαπειλεῖ κίνδυνον, ἀνάγκη ἵνα ἡ ἐκκρίσις αὕτη ἐν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς τὴν ἐς τὰ μάλιστα σωτήριον ἀποτελῇ ἐκκρίσιν.

§. 15.

Οἱ κακοήθεις πυρετοὶ καλῶς κατ' ἐκκρίσιν τῷ σηπεδονώδεσ διὰ τῷ ἐκτὸς δέρματι λύονται (§. ανωτ.). Ὅθεν ἔπεται, ὅτι τὰ κωλύοντα ταύτην αἰτία, ἢ ἐς τὸ παντελὲς ὑποπιέζοντα, αἰτία ὁμῶς ὥσι τῇ καλῶς λύσει ἐναντιούμενα. Ὅτω πλείω ἄρα, ὅτω τε μείζω καὶ ὅτω ἰχυρώτερα ἢ ἐξ αἰτίας τῷ κάμνοντος, ἢ τῶν παρεσῶτων, ἢ ἐξ ἰδιοσυγκρασίας τῷ ἀδυνάτου συ-

antec.); sed fluida excernenda sunt vel sanguis, vel fluida secreta: unde eccripsis maxime salutaris in morbis acutis malignis contingere debet per fluida secreta. Quoniam ergo per periphericam excretionem fluidum secretum excernitur; quoniam inter omnes excretiones fluidorum a sanguine separatorum copiosissima est; tandemque ob structuram cutis huic minimum periculum a materia putrida infertur: necesse est, ut excretio illa eccripsis maxime salutarem in febribus malignis constituat.

§. XVI.

Febres malignæ omnium optime solvuntur per excretionem putridi, factam in cute exteriori (§. ant.). Inde iam prono fuit alveo, quod causæ, quæ eandem impediunt, aut plane sufflaminant, causæ simul sint, quæ optimæ solutioni adversantur. Quo plures itaque, quo maiores, quo validiores causæ, vel ex culpa ægri, aut adstantium, vel ex individuali

corporis ægri constitutione concurrunt, eo peior esse debet solutio februm malignarum.

§. XVII.

Spasmus periphericus intercipit transpirationem; ille adeoque, & omne id, quod eundem determinat, causa esse poterit pessimi februm malignarum eventus. Hinc abundantia sanguinis, præsens vel in toto corpore, vel in locis quibusdam interioribus, inflammationes aliique tumores, orgasmi, depletiones vasorum, acrimonia feri, sudationes nimiae, aer frigidus, animi pathemata, idem efficere debebunt. Huius census quoque sunt vasa obstructa, rigida, debilia, aer humidus, a quibus se- & excretiones naturales modo impediuntur, modo prorsus supprimuntur, id docente Pathologia. Non poterit igitur dubitari, quin hæc omnia maxime salutari februm malignarum solutioni admodum noceant. (§. anteced.) (d)

§. XVIII.

(d) Uberius iam hæc tradidit Dn. D. LUDOLFF I. c.

νέρχονται αίτια, τοςάτω χείρων ή τών κακοηθών πυρετών εσαι λύσις.

§. ΙΖ.

Ο περιφερικός σπασμός επίχει την διαπνοήν αυτός τε τοιγαρύν κη πάν ό, τι αυτόν προσδιορίζει, αίτιον εσαι τής χείρονος τών κακοηθών πυρετών αποβάσεως. Διό ή υπερβάλλουσα τῷ αίματι περισσευσις ή έν όλω τῷ σώματι ή έντισιν ένδοτέροις τόποις παρῆσα, αί φλεγμονάι τε κη οι άλλοι όγκοι, οι όργασμοί, αί κενεαγγείαι, ή τῷ όρῶν δριμύτης, οι πολλοί ιδρώτες, όψυχρός αίρ κη ται τής ψυχῆς παθήματα τ' αυτό άποτελέσσειν, οίς συναριθμείται κη ται έμπεφραγμένα, σκληράτε κη αδύνατα αίγγεία, κη ό νότιος αίρ, ύφ' ών αί φυσικαί έκκρίσεις ποτέ μέν απέιργοντα εδ' ότε δε ες τὸ παντελές επίχοντα, διδασκέσης τῷ τής παθολογικῆς. Ότι άρα πάντα ταυτα την σωτήριον τών κακοηθών πυρετών λίαν βλάπτει λύσιν, αναμφίβολον (§. άνωτ.).

§. ΙΗ'.

Τῶν κακοήθων πυρετῶν αἰτία ἐστὶ τὸ ἐν τοῖς χυμοῖς σηπεδονῶδες (§. Η'). Ἐπεὶ ὅν τὸ σηπεδονῶδες ἐκείνο παντὶ Φυράματι καὶν μέγα τῆτο ἢ καὶν μὴ, προσφύεσθαι δύναται, ἔπεται τὸν κακοήθη πυρετὸν φύεσθαι σώματι τινι, ἐν ᾧ τὸ ποσὸν τῆς αἱματὸς μείζον ἢ ἡγιεινὴ εἰσπράττει κατάστασις, ἢ τοι ὅπερ γε ἡ πληθώρα χώραν ἐπέχει ἀλλὰ τῆνικαῦτα σύνθετός τις ἐκσυνόχῃς, ἥτοι συνεχῆς μὴ διαλείποντος καὶ συνεχῆς ὀξείας γεννᾶται πυρετός· ἀνάγκη ἄρα σηπεδονώδη σύνοχον προσδιοριθῆναι.

§. ΙΘ'.

Ἐκάτω πυρετῷ συμφορήσεις τῆς αἱματος πρὸς τὰ τῆς ἐγκεφαλῆς ἀγγεῖα συμπίπτειν, κακείνας τε μεγάλας γίνεσθαι ἐπειδὴν ἄλλ' αἵττα συντρέχωσι ταῖς τῶν συμφορήσεων τέτων αἰτίας ἐπαύξοντα, σαφῶς ἀποδέδεικται. Ἐπεὶ ὅν ὁ ὀξύς πυρετός ἐπικείμενον τῷ

§. XVIII.

Febres malignæ pro sua causâ putridum, quod humoribus inhæret, agnoscunt (§. VIII.). Quum putridum illud in qualibet massa suboriri possit, siue illa magna fuerit, siue non: inde iam sequitur, febrem malignam in corpore nasci posse, in quo maior sanguinis quantitas adest, quam ad statum sanitatis requiritur, siue ubi plethora obtinet. Sed tum oritur febris complicata, ex febre continente, siue continua non remittente, & febre continua acuta. (e). In casu itaque proposito synochus putrida determinetur necesse est.

§. XIX.

Cuilibet feбри congestiones versus vasa encephali competere, illasque gravissimas fieri, quando alia concurrunt, quæ causas harum congestionum adaugent, demonstratum est (f). Quum febris acuta supponat eminens periculum vitæ ægri inde

(e) conf. Excell. D. D. NIETZKI l. c.

(f) id. l. c.

productum (§. I); hoc vero sine graviore organorum vitalium afflictione cogitari nequeat; quum porro actiones cerebri & cerebelli ad vitales pertineant (per princip. physiolog.); necesse est, ut febris acuta cerebrum & cerebellum non mediocriter affligat. Hinc, præceptrice Pathologia, nascuntur congestiones versus vasa encephali, unde febris acuta gravioribus congestionibus versus caput stipata esse debet, quam febris in genere. Putridi effectus in vasa, est arrosio, hinc species debilitatis oritur. Sed vasa debilia pertinent ad causas congestionum. Quare putridum congestiones efficere valet. Quum causa morbi cuiusdam in illa præcipue loca agat, quæ iam affecta sunt: putridum ergo, quo nunquam caret febris maligna, in vasa encephali potissimum agere debet. Unde colligitur, febres acutas, non destitutas putrida materia, qua humores scatent, inter omnes febres præ-

νοσθῶντι ὑποτίθῃσι κίνδυνον (§. α'), τῷ το δὲ ἄνευ μεγίστης τῶν ζωτικῶν ὀργάνων κακώσεως ἐννοεῖσθαι ἔδύναται, Ἐπεὶ αὖθις αἱ τῷ ἐγκεφάλῳ καὶ τῇ παρεγκεφαλίδος ἐνέργειαι ταῖς ζωτικαῖς ἀνήκῃσι (κατὰ τὰς φυσιολογ. ἀρχάς), ἀνάγκη τὸν τε ἐγκέφαλον καὶ τὴν παρεγκεφαλίδα ἔμετρῶς τῷ ὀξείῳ κακῶσθαι πυρετῷ. Ὅθεν, διδακτικῆς τῆς παθολογικῆς, αἷματος συμφορήσεις πρὸς τὰ τῷ ἐγκεφάλῳ ἀγγεῖα γίνονται, ἐξ ὧν μείζοσι πρὸς τὴν κεφαλὴν συμφορήσεσιν ὁ ὀξύς, ἢ ὁ ἐν γένει σύνεσι πυρετός. Ἡ τῷ σηπεδονώδεις ἐν τοῖς ἀγγείοις ἐνέργεια ἢ τέτων ἐστὶ διάβρωσις, ἐξ ἧς εἶδος τι ἀδυναμίας φύεται. Ἀλλ' ἡ τῶν ἀγγείων ἀδυναμία ταῖς τῶν συμφορήσεων αἰτίαις συγκαταλέγεται. Τὸ σηπεδονῶδες ἄρα συμφορήσεις ἀποτελέσθαι δύναται. Ἐπεὶ τὸ νοσήματός τινος αἴτιον ἐν τοῖς ἤδη πεπονθότιν ἐνεργεῖ τόποις: τὸ σηπεδονῶδες ἄρα τῷ κακοήθει πυρετῷ αἰεὶ συνημμένον ἐν τοῖς τῷ ἐγκεφάλῳ μάλιστα ἐνεργήσῃ ἀγγείοις. Ἐντεῦθεν συνάγεται τὰς μετὰ σηπεδονῶδεις

ὁξείας πυρετὸς πάντων μάλιστα τὰς
μεγίστας πρὸς τὴν κεφαλὴν ἀποτελεῖν
συμφορήσεις. Τῷδ' ὅπερ ἐπὶ πάντων
τῶν κακοήθων πυρετῶν ἀληθεύσεται
(§. §. ζ. κ. η').

§. η'.

Ἐπεὶ τὸ τῷ αἵματι ἐν γένει πο-
σὸν ἔδεν κωλύει ἵνα μὴ κακοήθης γένη-
ται πυρετός (§. η'). δυνατόν ἵνα κ.
οἱ ταῖς τῷ αἵματι πρὸς ἄλλὰ τινα
σπλάγχνα συμφορήσῃν ὑποκείμενοι
τῷτον συλλάβωσιν. Ἀλλὰ γε τὸ ση-
πεδονῶδες ἐπαύξει τὰς συμφορήσεις
(§. ἀνωτ.). Ὅτι ἄρα ἐν τέτοις μεγίσται
γίγνονται συμφορήσεις πρόδηλον.

§. κα'.

Πείθουσιν οἱ παθολογῶντες τὴν
τῆς φλεγμονῆς ἔδραν εἶναι ἢ ἐν ταῖς
περὶ τὰ πέρατα τῶν ἀρτηριῶν ὑμενώ-
δεσιν ἐνρυχωρίαις, ἢ ἐν τοῖς αἱματικοῖς,
ἢ ἐν τοῖς ὀρέσσοις λυμφατικοῖς ἀρτηριώ-
δεσιν ἀγγείοις. Διὸ ὑποτίθεται μετά-
βασις, τῷ αἵματι, ἢ ἐν ταῖς ὑμενώδε-
σιν ἐνρυχωρίαις, ἢ τοῖς ἀρτηριώδεσιν
ἀγγείοις τῶν αἱματικῶν σμικροτέροις,

pravissimas producere congestiones
versus caput. Id quod iam vale-
bit de febribus malignis (§§. VII
& VIII.).

§. XX.

Quum sanguinis quantitas in ge-
nere non impediat, quo minus febris
maligna suboriatur (§. XVIII.): fieri et-
iam potest, ut illam quoque eiusmodi
subiecta concipiant, quæ congestionibus
versus alia viscera obnoxia sunt. Sed pu-
tridum adauget congestiones (§. antec.).
Quod itaque in hoc casu acerbiores,
immo acerbissimæ fiant congestiones,
luculentissime constat.

§. XXI.

Evincunt Pathologi, inflamma-
tionis sedem esse modo in tela cellu-
losa, modo in vasis sanguiferis arte-
riosis, modo in vasis serosis lymph-
aticis arteriosis. Hinc requiritur san-
guinis transitus vel in telam cellulo-
sam, vel in vasa arteriosa sanguiferis
minora, vel obstructio vasorum san-
guiferorum arteriosorum, cum impe-

tu sanguinis a tergo urgentis versus locum obstructum connexa. Fluidum vero rarefactum facile transit in vasa minora; debilitat vasa sanguifera arteriosa; deponit particulas terrestres, simulque, putrido accedente, irritat (per princip. patholog.). Sed febris maligna supponit putridum & rarefactam massam humorum (§. VIII.). Ad febrem itaque malignam accedere potest inflammatio, quod etiam satis superque per experientiam constat.

§. XXII.

Quando in parte inflammata partes solidæ quoque in putredinem ruunt, tum inflammatio soluitur per sphacelum, & æger satis cedere debet, prouti id docent Pathologi. Quum corpora putrescentia cum aliis adhuc a putrefactione liberis suam putredinem communicent, idque eo magis, quo diutius duraverit materiae putridæ contactus cum parte putredinem initura: inflammatio, quæ febri

ἢ ἔμφραξις τῶν αἱματικῶν ἀρτηριῶδων ἀγγείων σὺν ὀρμῇ τῆς αἵματος βιάιως κατόπιθεν φερομένης πρὸς τὸν ἐμπεφραγμένον τόπον. Τὸ ἀραιωθὲν δὲ ὑγρὸν ῥαδίως μεταβαίνει εἰς τὰ μικρὰ ἀγγεῖα, ἀδυνατοῖ τὰ ἀρτηριώδη ἀγγεῖα, ἀποτίθησιν τε τὰ γεώδη μόρια καὶ αἷμα σηπεδόνος προσπесέτης, ἐρεθίζει (πατὰ τὰς παθολογ. ἀρχάς). Ἀλλ' ὁ κακοήθης πυρετὸς ὑποτίθησι σηπεδονῶδες καὶ ἡραιωμένους χυμούς (§. η'). Τῷ κακοήθει ἄρα πυρετῷ συμπεσεῖν δύναται φλεγμονή, ὃ δὴ καὶ ἀπὸ τῆς πείρας καταμαθεῖν ἔξεσι.

§. κβ'.

Ἐπειδὴν ἐν τινι μορίῳ φλεγμῇ-ναντι καὶ τὰ στερεὰ μόρια εἰς σήψιν κα-τολιθίσωσιν, ἡ φλεγμονή τηνικαῦτα διὰ σφακελισμῶς λύεται, καὶ ὁ κάμνων ἀπόλλυται, ὡς παθολογῶντες διδάσκου-σιν. Ἐπεὶ ἔν τὰ σηπόμενα σώματα ἐτέροις ἔπω σεσηπόσι τῆς ἰδίας μετα-δίδωσι σήψεως. καὶ γε τοσούτω μᾶλ-λον ὅσω χρονιώτερον ἡ τῆς σηπεδονώ-δους ὕλης διαμένει ἐπαφῇ τῷ τῆς σή-ψεως μεταληψομένῳ μορίῳ, ἢ ἄρα τῷ

κακοήθει πυρετῷ ἐπισυμβαίνουσα
φλεγμονή διὰ θανάτου λυθίσεται.

§. κγ'.

Ἄι τῷ αἵματος συμφορήσεις ἀπο-
τελῶσι περιφερικὸν σπασμὸν, φλεγμο-
νὰς, καὶ ἀδυναμίαν. Ὁ περιφερικὸς δὲ
σπασμὸς καὶ ἡ ὑπερβάλλουσα ἀδυναμία
ταῖς αἰτίαις συγκαταλέγονται ἐξ ὧν
ἑτέρας συμφορήσεις πρὸς τὰς κεκακω-
μένους τόπους συμβαίνει, διὸ τὰς προ-
τέρας αὐξηθῆναι δεήσει. Θές δὴ νῦν
τὸ, §§. ιη'. καὶ ιθ'. μνημονευθὲν ἐμπε-
σεῖν νόσημα, καὶ ὁμολογήσεις τὸν κακοή-
θη πυρετὸν διὰ θανάτου κριθήσεσθαι
(§§. ιζ'. καὶ κβ').

§. κδ'.

Ἐπεὶ αἱ συμφορήσεις εἰ μόνον πρὸς
τὸ τῆς ἀδυναμίας τε καὶ τῷ περιφερικῷ
σπασμῷ συντείνουσιν αἴτιον, ἀλλὰ δὴ
καὶ ἀπὸ τῶν παρ' αὐτῶν γι-
νώσκεται, τῷθ' ὅπερ περὶ τῶν συμφο-
ρήσεων τῶν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς
προσημμένων §. ανωτ. εἰρήται, συμφω-
νεῖν ὡσαύτως τῇ τε ὑπερβάλλουσῃ ἀδυ-
ναμίᾳ καὶ τῷ περιφερικῷ σπασμῷ καθ'
ὅσον τῷ κακοήθει πυρετῷ συμβαίνει.

febri malignæ supervenit, non nisi
per mortem solvi poterit.

§. XXIII.

Congestiones determinant spas-
mum periphericum, inflammationes,
debilitatem. Spasmus periphericus,
debilitas nimia, ad causas pertinent,
unde novae congestiones versus loca
afflicta contingunt; hinc priores ad-
augeantur oportebit. Pone nunc, ca-
sum §§. XVIII. & XIX. subortum
esse, & concedere debebis, febrem
malignam, sibi relictam, per mor-
tem iudicatum iri (§§. XVII. &
XXII.).

§. XXIV.

Quum congestiones non solum
ad causas debilitatis & spasmi peri-
pherici pertineant, sed etiam ab
iisdem producantur: facile cognosci-
tur, id, quod de congestionibus, fe-
bri malignæ sese adiungentibus, §. an-
teced. dictum est, respondere etiam
nimiae debilitati & spasmo periphe-
rico, quatenus accedentibus ad fe-
bres malignas. Ergo hæmorrha-

giæ efferæ lethalem solutionem harum febrium determinare valent.

§. XXV.

Plethora corpus debilitat, congestiones sanguinis efficit, spasmus periphericum determinat, inflammationes producit, si imprimis commota fuerit (per princip patholog.). Febres continentes pro sua causa habent plethoram commotam, de cuius effectibus concurrentibus ad febrem malignam demonstratum est, illos lethiferos fieri posse (§. XXII.). Hinc in casu ad §. XVIII. proposito, febricitantis vita maximo subiacebit discrimini.

§. XXVI.

Plethoram, graviores congestiones, inflammationes viscerum, febribus malignis advenientes, funestus morbi eventus excipere solet (§§. XXII. XXIII. & XXV.). Ne itaque idem eveniat, opus est, ut therapeutica accersitus ad eiusmodi ægrum, talia remedia adhibeat, quibus tantum periculum discutiatur. Verum enim vero

Λαῖβοι ἄρα αἰμορραγίαι ὀλέθριον τῶν πυρετῶν τέτων λύσιν ἀποτελέσασθαι δύνανται.

§. κέ'.

Ἡ πληθώρα ἀδυναμίαν ἀμποιεῖ τῷ σώματι, συμφορήσεις τῆ αἵματος ἀπεργάζεται, σπασμόν τε περιφερικόν προσδιορίζει, καὶ φλεγμονὰς ἀποτελεῖ, μάλιστα δὲ ἢν ὄργα (κατὰ τὰς παθολογ. ἀρχάς). Ἀίτιον δὲ τῶν συνόχων ἢ ὄργων ἐστὶ πληθώρα, ἧς τὰ ἀποτελέσματα τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς συμπίπτοντα ὀλέθρια γίνεσθαι, ἀποδεδεικται (§. κβ'). Διὸ κατὰ τὴν §. ιη'. ὑπόθεσιν, διπυρέττοντες μεγίστω κινδύνῳ ὑπόκεινται.

§. κς'.

Τὴν πληθώραν, τὰς μεγάλας τε τῆ αἵματος συμφορήσεις καὶ τὰς τῶν σπλάγχχνων φλεγμονὰς τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς συμβαινέσας ὀλέθριος τῆ νοσήματος ἀπόβασις προσδέχεσθαι εἴωθε (§. κβ'. κγ'. καὶ κέ'). Ἵνα τοίνυν μὴ τέτο γένηται ὁ τοῖς τόν τινα ἀθενῶντα θεραπεύσων τοιαῦτα ὀφείλει παραλαβεῖν βοηθήματα, οἷς ὁ τοσῶτος

ἀποκρέσσεται κίνδυνος. Οὐμὴν ἀλλ' ὁ
κακοήθης πυρετός προσγίνεσθαι δύνα-
ται ἄνευ πληθώρας, ἄνευ τε δεινῶν τι-
νῶν πρὸς τὰ σπλάγχνα συμφορῆσεων,
ἢ ἄνευ φλεγμονῶν. Ὅθεν ἔπεται
ὅτι αἰεὶ ἀναγκαῖον εἶναι, ἵνα ὁ τῶς τοῖς
κακοήθεσι πυρετοῖς προτπαλαίοντας
θεραπεύσων τέτοις τοῖς βοηθήμασι
χρησθῇται ἢ μάλιστα τοῖς ἡρωικοῖς, ἃ τῷ
ἤδη περιγραφέντι πάθει προσήκῃσι.

§. κζ'.

Περὶ μὲν ἐν τῇς φύσεως τῶν κακοη-
θῶν πυρετῶν τοσαῦτα ἔδει προδιόρι-
σαθαι ὥς τὸ παρὸν ἀπῆται ἐπιχείρη-
μα. Περὶ δὲ ἀπὸ τῶν μέχρι τῶδε
προληφθεῖσων ἀρχῶν ἀποφηαίμεν τὴν
φλεβοτομίαν ἐν τοῖς ὁξέσιν ἅμα ἢ
κακοήθεσι πυρετοῖς ἔκ αἰεὶ ἀναγκαῖαν
εἶναι, διὰ βραχείων ὥς διόν τε ὀρίσῃον
δοῖμα, τίποτ' ἀν' εἴη ἀναγκαῖον βοήθη-
μα, τίνα τε βοηθήματα ἢ φάρμακα
ἐν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς ἀναγκαῖα
λεκτέα; τήνικαῦτα γὰρ ἐναργὲς ἔσται,
τὴν ἀποδειχθισομένην πρότασιν εἰς τὰ
μάλιστα τῇ ἀληθείᾳ ξυνάδειν. Τὸ
σκοπιμώτατον τῆς θεραπείας τέλος

vero febris maligna oriri potest sine
plethora, sine gravioribus quibusdam
congestionibus ad viscera, tandem-
que sine inflammationibus. Quare
iam sequitur, non semper necessa-
rium esse, ut therapeuta ad sanandos
ægotantes ex febribus malignis ista
remedia adhibeat, atque imprimis
heroica, quæ nunc descripto malo
tollendo conveniunt.

§. XXVII.

Atque hæc sunt, quæ de natu-
ra febrium malignarum præmittenda
esse postulabat decens argumenti
præsentis tractatio. Antequam vero
ex principiis hætenus adhibitis evi-
dum faciam, venæ sectionem in fe-
bribus acutis malignis non semper
esse necessariam, brevissimis adhuc in-
dicandum esse reor, quid per reme-
dium quoddam necessarium intelligi
debeat? & qualia remedia aut medi-
camenta in febribus malignis neces-
saria dicenda sint? Tum enim cla-
rius apparebit, propositionem iam
iam demonstrandam cum veritate

quam maxime convenire. Ultimus therapiae finis est sublatio, aut saltem imminutio morbi. Hinc remedium aut medicamentum utile vocandum, quod morbum tollit, vel si iste curari non potest, eum imminuit. Ex quibus notio quoque remedii aut medicamenti noxii patet. Neque minus inde intelligitur, remedia aut medicamenta utilia duplici modo considerari posse: vel enim sine istis morbus curari, aut saltem imminui nequit, vel potest; si prius, erunt necessaria, si posterius, erunt non necessaria. Remedium itaque necessarium est id, sine quo sanitas amissa prorsus restaurari non potest. Ex quo cognoscitur, non omne remedium utile simul esse necessarium, noxium vero nunquam necessarium esse posse. Quilibet morbus considerari potest vel abstracte, vel quatenus huic vel isti subiecto inexistit. Sed docet Pathologia, fieri posse, ut in subiecto quodam determinationes nonnullae ad morbum accedant, quae effi-

ἔσιν, ἢ τῶ παθήματος ἀναίρεσις, ἢ καὶ γὰρ ἢ τῶ μείωσις. Ὅθεν βοήθημα ἢ φάρμακον ὠφέλιμον ὀνομάζεται, τὸ αἶρον τὸ νόσημα, ἢ μειῶν τῶτο εἶγε ἀνίατον. Ἐξ ὧν καὶ τίποτ' ἐστὶ βλαβερόν βοήθημα ἢ φάρμακον φαίνεται. Οὐχ ἥττον δ' ἐντέτυθεν συνιδεῖν ἔξεσι τὰ ὠφέλιμα βοηθήματα ἢ φάρμακα διχῶς μάλιστα δεῖν θεωρεῖσθαι: ἢ γὰρ ἄνευ τῶτων τὸ νόσημα θεραπευθῆναι δύναται, ἢ ἔ. εἰμὲν τὸ πρῶτον, ἐκ ἀναγκαῖα ἔσονται, εἰδὲ τὸ δεύτερον, ἀναγκαῖα. Βοήθημα τοιγαρὶν ἀναγκαῖον ἐκεῖνό ἐστιν, ἔ. ἄνευ ἢ ἀπολωλυῖα ὑγιεία ἐπαναληφθῆναι ἔ. δύναται. Καὶ τῶ δῆλον, ἔ. πᾶν ὠφέλιμον βοήθημα ἅμα καὶ ἀναγκαῖον εἶναι, τὸ βλαβερόν δὲ ἔ. δέποτε. Ἐκαστον νόσημα ἢ ἀφρημένως θεωρεῖσθαι δύναται, ἢ καθότι τῶ ἢ ἐκείνῳ ἐνυπάρχει τῶ ὑποκειμένῳ. Ἀλλ' ἐνδέχεται, ὡς ἡ παθολογία διδάσκει, ἐν τινὶ ὑποκειμένῳ δι' αἷς τινὰς περιστάσεις τῶ νοσήματι ἐμπίπτειν ἵνα τὸ καθ' ἑαυτὸ μὴ θανάσιμον νόσημα, θανάσιμον γένηται. Ἐναργῆς ἐκ τῶτων καθίσταται, ὅτι βοήθημά τι

ἢ Φάρμακον ὡς πρὸς τὸ ἀφηρημένως
θεωρῶμενον νόσημα, ἐκ ἀναγκαῖον δύ-
ναται εἶναι, ὃ γεμὴν ὡς πρὸς τὸ τέτω
ἢ ἐκείνῳ τῷ ὑποκειμένῳ ἐνυπάρχον, ἐς
τὰ μάλιστα, εἶναι ἀναγκαῖον. Ἀλλ' ὡς
πρὸς τὸτο λέγειν ὀφείλομεν ἐκ αἰεὶ αὐ-
τὸ ἀναγκαῖον εἶναι.

§. κη'.

Οὐδὲν νόσημα εἰς ὑγίαν τρέπε-
ται, ἢ μὴ πρότερον ἀναιρεθῇ τὸ αὐ-
τῷ αἷτιον. Ὅθεν οἱ κακοήθεις πυρε-
τοι ἀφηρημένως θεωρῶμενοι τοιαῦτα
εἰσπράττονται βοηθήματα τε καὶ Φάρ-
μακα, ὧν ἄνευ τὸ τοῖς χυμοῖς ἐνυπάρ-
χον σηπεδονῶδες ἢ διορθωθῆναι ἢ τῷ
σώματος ἐκκενωθῆναι εἰ δυνατόν. Ἀλλ'
ἐνδέχεται ἵνα ἰδιοσυγκρασία, τις ἐν
τῷ ὑποκειμένῳ ἐπικρατῇ τὴν τῷ ση-
πεδονῶδες ἐπίχρη ἐκκρίσιν, καὶ ντεῦθεν
οἱ πυρετοὶ ἔτοι θανάσιμοι γένωνται.
διὸ αἱ ἐκμέσθαι τοιαῦτα ποῖνται κω-
λύματα, ταῦτα ἀναγκαῖα εἶναι
βοηθήματα, καὶ μὴ τὸ σηπεδονῶδες συν-
τρίβωσι. Περὶ ὧν λέγειν ὀφείλομεν

efficiunt, ut morbus per se quidem non
lethalis, fiat lethalis. Constat inde, re-
medium quoddam vel medicamentum,
respectu morbi in abstracto considera-
ti, esse posse non necessarium, quod ta-
men respectu morbi, huic vel isti subie-
cto inhærentis, admodum necessarium
est. Sed in eo casu dicere debemus,
illud non semper esse necessarium.

§. XXVIII.

Nullus morbus in sanitatem trans-
it, nisi antea eius causa fuerit sub-
lata. Hinc febres malignæ, in abstra-
cto consideratæ, non nisi eiusmodi
remedia & medicamenta sibi vindi-
cant, sine quibus putridum, humori-
bus inexistens, vel corrigi, vel ex cor-
pore eliminari nequit. Sed fieri po-
test, ut in subiecto quodam determi-
natio quædam individualis obtineat,
quæ putridi excretionem impedit,
indeque efficitur, ut istæ febres le-
thales fiant. Quare remedia, quæ
eiusmodi impedimenta e medio tol-
lunt, necessaria erunt, licet putridum
non infringant. Quo in casu dicere

debemus, illa non semper esse necessaria (§. ant.). Nullum remedium & medicamentum noxium necessarium est (§. ant.). Hinc si demonstratum fuerit, illud sub quibusdam circumstantiis in febribus malignis nocere, eo minus ibi necessarium erit. Quibus nunc præmissis, ad effectus venæsectionis me converto, inde demonstraturus, illam in febribus acutis malignis non semper esse necessariam.

§. XXIX.

Venæ sectio est operatio chirurgica, mediante qua sanguis ex vena incisa educitur. Hinc effectus venæsectionis in genere nullus alius esse potest, quam qui per evacuationem sanguinis ex corpore concipitur.

§. XXX.

Effectus venæ sectionis est, ut sanguis evacuetur (§. ant.). Verum nulla evacuatio contingere potest, nisi simul imminuta evacuati quantitate in corpore humano. Hinc sanguinis quantitas per venæ sectionem in corpore nostro imminuitur. Quælibet

eva-

ἐκ αἰεί ἀναγκαῖα εἶναι (§. ἀνωτ.). Οὐδὲν βλαβερὸν βοήθημά τε ἢ φάρμακόν ἐστιν ἀναγκαῖον (§. ἀνωτ.). Ὅπερ εἰ ἀποδειχθεῖη κατὰ τι βλάπτειν ἐν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς, τοσούτω ἥττον ἀναγκαῖον ἐν τέτοις ἔσται ὧν νῦν προδιοθέντων ἐπὶ τὰ τῆς φλεβοτομίας ἐνεργήματα τρέψομαι, ἐντεῦθεν ἀποδείξων ἐκ αἰεί ταύτην ἐν τοῖς ῥηθεῖσι πυρετοῖς ἀναγκαῖαν εἶναι.

§. κθ'.

Ἡ φλεβοτομία χειρουργικὴ τις ἐστὶν ἐγχείρησις, δι' ἧς αἷμα ἐκ τῆς τμηθείσης φλεβὸς ἀφαιρεῖται. Ὅθεν ἢ ἐν γένει τῆς φλεβοτομίας ἐνέργεια ἕδεμια ἄλλη, ἢ ἡ ἐν τῇ κενώσει τῷ αἵματι ἐκ τοῦ σώματος θεωρημένη.

§. λ'.

Τῆς φλεβοτομίας ἐνέργειά ἐστιν ἢ τῷ αἵματι κένωσις (§. ἀνωτ.) Ἀλλὰ γὰρ ἕδεμια κένωσις γίνεται, ἢν μὴ ἅμα τὸ ποσὸν τοῦ κεκενωμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ μειωθῇ σώματι. Διὸ ἡ ποσότης τοῦ αἵματος μειῖται διὰ τῆς φλεβοτομίας ἐν τῷ ἡμετέρῳ σώματι. Πᾶ-

σα κένωσις αὐτῆς ὑποτίθῃσιν ἵνα τό
ἐκκενωθησόμενον λαύρως κατατκήψῃ
εἰς τὸν τόπον ἐν ᾧ ἡ κένωσις γίνεταί,
ὥς δὴ ἐπὶ ῥέοιαν μείζονα, ἥτις πάλιν
ἐννοηθῆναι εἰ δυνατόν, ἢν μὴ ἡ τῷ ἐκκε-
νωθησομένῃ ποσότης ἐν ἑτέροις μειωθῇ
μέρεσιν. Ὅθεν ἡ φλεβοτομία ἐμόνον
ἐν ὅλῳ τῷ σώματι, ἀλλὰ δὴ καὶ τῷ
ἢ ἐκείνῳ τῷ μέρει τὴν τῷ αἵματι
μειοῦ ποσότητά.

§. λα'.

Ἡ πληθώρα μείζονα ὑποτίθῃσι
τῷ αἵματι ποσότητά ἢ εἰς τὴν ὑγίαν
ἀπαιτεῖται. ἢ πλείων αὐτῇ ποσότης
τῷ αἵματι ἢ ἐν ὅλῳ ἐπὶ τῷ σώματι,
ἢ ἐν ἐνὶ ἢ ἑτέρῳ τῷ αὐτῷ μέρει. εἰμὲν
τὸ πρῶτον, γενικὴ λέγεται: εἰδὲ τὸ
δεύτερον μερική, ἥτοι συμφόρησις. Ὅ-
θεν τῇ φλεβοτομίᾳ ἢ, τε πληθώρα καὶ
αἱ συμφορήσεις αἴρονται (§. ἀνωτ.).
Ἐπεὶ δὲ ὁ χρόνος ἐν ᾧ τὸ αἷμα ἀφαιρεῖ-
ται τῷ σώματι συγκρινόμενος ἐκεῖ-
νῳ τῷ χρόνῳ καθ' ὃν αἱ ἄλλα βοηθή-
ματα ἢ φάρμακα, ὡσαύτως πρὸς τὸ
ταῦτα φυγαδεῦσαι ἐπιτήδεια, ἐνεργ-
γεῖται, πολλῷ βραχύτερος: ἀνάγκη ἵνα

cuatio porro supponit, ut evacuan-
dum maiore in copia ad locum de-
feratur, ubi evacuatio ad actum de-
ducitur, hinc adfluxum maiorem, qui
denuo concipi nequit, nisi simul lar-
giri velis imminutam evacuandi quan-
titem in aliis partibus. Quare ve-
nae sectio non solum in toto cor-
pore, sed etiam in hac vel illa parte
sanguinis quantitatem minorem reddit.

§. XXXI.

Plethora supponit sanguinis quan-
titem maiorem in corpore humano,
quam quæ ad sanitatem requiritur.
Quantitas ista maior sanguinis vel est
in toto corpore, vel in una aut al-
tera eiusdem parte: si prius, dicitur
universalis; si vero posterius, erit
tunc particularis, sive congestio. Hinc
venæ sectione tolluntur & plethora,
& congestiones (§. ant.). Quoniam
autem tempus, quod fluit, dum ve-
næ sectione sanguis e corpore educi-
tur, comparatum cum illo tempore,
quando alia remedia vel medicamenta,
iisdem quoque profligandis apta, a-

gunt, longe brevius est: necesse erit, ut venæ sectio plethoram & congestiones longe citius tollat, quam ulla alia remedia.

§. XXXII.

Caussa effectus cuiusdam est simul caussa effectus illius, qui a priorē dependet. Sed venæ sectio tollit plethoram & congestiones (§. ant.); quare & effectus inde productos tollit. Sunt vero isti effectus, spasmus periphericus, periculum inflammationis, debilitas, novæ congestiones (per princip. patholog.): hæc igitur mala ope venæ sectionis supprimi debent, quare in casibus prædictis instituta venæ sectione, transpiratio restitui, robur corporis augeri, imminens periculum inflammationis nonnunquam congestionē averti poterit.

§. XXXIII.

Quælibet inflammatio salutariter solvitur aucto corporis robore, aucta transpiratione, imminuta sanguinis

ἢ Φλεβοτομία τὴν πληθώραν καὶ τὰς συμφορήσεις πολλῶν τάχιον αἶρει, ἢ ἄλλο τι βοήθημα.

§. λβ'.

Τὸ αἰτιατὲ τίνος αἰτίον, αἰτίον ἅμα ἐστὶ τῷ αἰτιατὲ ἐκείνῳ, ὃ τῷ προτέρῳ ἐξήρηται. Ἀλλ' ἡ Φλεβοτομία αἶρει τὴν πληθώραν καὶ τὰς συμφορήσεις (§. ἀνωτ.), ἄρα καὶ τὰ ταύτης ἀποτελέσματα. Εἰσι δὲ ταῦτα ὁ περιφερικὸς σπασμὸς καὶ ὁ τῆς Φλεγμονῆς κίνδυνος, ἡ ἀδυναμία τε καὶ αἱ ἕτεραι συμφορήσεις (κατὰ τὰς παθολογ. ἀρχάς): τὰ δεινὰ τοιγαρὲν ταῦτα τῇ τῆς Φλεβοτομίας βοηθείᾳ ὑποπιέζονται. Ὅθεν ἐν ταῖς προειρημέναις συμπτώσεσι, παραληφθείσης τῆς Φλεβοτομίας, ἡ διαπνοὴ ἀποκαθίσταται, ὁ τόνος τε τῷ σώματι αὐξεται καὶ ὁ τῇ συμφορῇ ἐὸν ὅτε ἐπικείμενος τῆς Φλεγμονῆς ἀπωθεῖται κίνδυνος.

§. λγ'.

Πᾶσα Φλεγμονὴ σωτηρίως λύεται τῆς δυνάμεως τῷ σώματι καὶ τῆς διαπνοῆς αὐξηθείσης, καὶ μειωθείσης

τῆς πρὸς τὸ φλεγμῆναν μέρος τῆς αἵματος συμφορήσεως. Ἄνεργήματα ἐπεὶ ἀπὸ τῆς φλεβοτομίας καὶ δὴ καὶ ταχέως προσδέχεται ἔξω (§. §. λ' καὶ λβ'), αὕτη δὴ παρθεὶς ἐκ ἀσύμφορον εἶναι βοήθημα εἰς τὸ ὁξέως διαφορῆται τὴν φλεγμονήν.

§. λδ'.

Ἡ φλεβοτομία ἐδεμίαν ἄλλην ἀποτελεῖ ἐνέργειαν ἢ τὴν ἀπὸ τῆς τῆς αἵματος κενώσεως (§. κθ'), Ἄλλ' ἐκ τῆς μειωθείσης τῆς αἵματος ποσότητος συνιδεῖν ἔδαμῶς ἐνι, τὴν μίξιν τῆς ἐν τῷ ἀνθρώπινῳ σώματι αἵματος ἢ ἀνατρέπεσθαι ἢ διορθῆσθαι. Ὅθεν ἢ κακὴ τῶν χυμῶν μίξις διὰ τῆς φλεβοτομίας ἐκ αἵρεται.

§. λε'.

Ἐν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς ἢ σηπεδονώδης ἐπικρατεῖ ὕλη (§. η'), τὴν ἀρχὴν λαβῆσαι ἀπὸ τῆς διεφθαρμένης τῶν ὑγρῶν μίξεως (§. β'). Ἄλλ' αὕτη ἢ ὕλη συνάμα τῇ τῶν ὑγρῶν ἀραγώττει τὸ τῶν κακοηθῶν πυρετῶν συνίστησιν αἷτιον (§. §. γ' καὶ η'). Εἰμὴ ἄρα ἢ τῶν ὑγρῶν αὕτη πρότερον ἀρθῇ διάθεσις, ἐδέπο-

nis versus partem inflammata[m] congestionem. Quos effectus dum a venæsectione, eosque ab illa cito produci spectare licet (§§. XXXI & XXXII), illa omnino erit remedium ad inflammationem repente discutiendam haud incongruum.

§. XXXIV.

Venæsectio non alios edit effectus, quam qui pendent ab evacuatione sanguinis (§. XXIX.). Sed ex imminuta sanguinis quantitate nullo prorsus modo perspicere licet, mixtionem sanguinis, in corpore humano remanentis, aut depravari, aut corrigi. Unde mala humorum mixtio non tollitur per venæsectionem.

§. XXXV.

In febribus malignis putrida materia locum habet (§. VIII), orta a prava humorum mixtione (§. II.). Sed ipsa materia, una cum rarefactione fluidorum, causam febrium malignarum constituit (§§. III & VII.). Nisi igitur status iste massæ humorum prius tollatur, numquam in gra-

tiam cum sanitate redibit æger ex morbo acuto maligno (§. XXVIII.). At, ad hoc efficiendum venæsectio nihil confert (§. ant.). Qua de caussa venæsectio in febribus malignis, abstracte consideratis, non est necessaria (§. XXIX & XXXIV.).

§. XXXVI.

Accedentibus ad febrem malignam plethora, gravioribus congestionibus versus loca interiora corporis, illorumque inflammationibus, opus est, ut id eligat remedium therapeutæ, quod citissime iisdem mederi valeat (§. XXIV.). Huius conditionis quum fit venæsectio (§§. XXXI & XXXIII.): necesse est, ut in casibus modo enarratis vena pertundatur.

§. XXXVII.

Sed extra hosce quoque casus febris maligna existere potest (§. XXVI.). Quoniam vero tum demum utilis est venæsectio in febribus malignis, si ad illas accesserint casus in §. anteced. notati (§. XXXIV.): minime ideo sem-

τε ὁ καίμων ἀπὸ τῆς κακοήθους πυρετοῦ εἰς τὴν ὑγίειαν ἐπανελεύσεται (§. κή). Ἀλλὰ γε πρὸς τὸ τοῦδε συντελεῖ ἡ φλεβοτομία (§. ἀνωτ.). Διὸ ἡ φλεβοτομία ἐν τοῖς ἀφρημένως θεωρημένοις κακοήθεσι πυρετοῖς ἐκ ἔσιν ἀναγκαία (§. §. κθ. κζ. λδ').

§. λς'.

Προσερχομένων τῷ κακοήθει πυρετῷ πληθώρας, δεινῶν τε πρὸς τὰς ἐνδοτέρας τῆς σώματος τόπας συμφορήσεων καὶ φλεγμονῶν, τοιοῦτόν τι ὁ θεραπευτὴς ἐκλέξασθαι ὀφείλει βοήθημα, ὅπερ ὅτι τάχιστα ταύταις ἰάσθαι δύναται (§. κς'). Ἐπεὶ τοιοῦτόν τι ἐστὶν ἡ φλεβοτομία (§. §. λα' καὶ λγ'): ἐν ταῖς τοιαύταις συμπτώσεσι σχάσαι τὴν φλέβα, ἀνάγκη.

§. λζ'.

Ἀλλὰ δὴ καὶ ἐκτὸς τῶν συμπτωμάτων τῶν δυνάμεται ὑπάρχειν ὁ κακοήθης πυρετός (§. κς'). Ἐπεὶ δὲ τῆνικαῦτα μόνον ὠφέλιμος ἡ φλεβοτομία, ἐπειδὴν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς τὰ §. ἀνωτέρω εἰρημένα συμπίπτωσι (§. λδ'):

διὸ ἐκ αἰὶ ὠφέλιμος τέτοις ἡ φλεβοτομία ἔσται.

§. λη'.

Πᾶν τὸ ἐν νοσήματι τινὶ ἀναγκαῖον βοήθημα, ὠφέλιμον εἶναι ὀφείλει (§. κζ'). Ἀλλ' ἡ φλεβοτομία ἐκ αἰὶ ὠφέλιμος ἐν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς (§. ἀνω'). Ὅθεν αὖθις συμπεράσεται τὴν φλεβοτομίαν ἐκ αἰὶ ἀναγκ. κ. τ. λ.

§. λθ'.

Διὰ τῆς φλεβοτομίας ἡ ποσότης μειᾶται τῷ αἵματι (§. λ'): θῶμεν δὴ τὰ, §. λς' διορισθέντα μὴ παρῆναι τυμπτώματα, ἔδεν ἥττον δὲ παραλαμβάνεσθαι τὴν φλεβοτομίαν: τῆνικαὐτὰ ἡ πρὸς τὴν ἐξάντλησιν τῶν ἀγγείων αὕτη παραλαμβάνεται, ἢ ἔ. Εἰμὲν τὸ πρῶτον, τῇ σκληρᾷ ἰσορροπότητι αἰμορρογία, ἣν θανάσιμον εἶναι εἴρηται §. κδ': ὅθεν ἡ φλεβοτομία ἐν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς βλαβερὸν ἔσται βοήθημα (§. κζ'). Εἰ δὲ τὸ ὕπερον τιθεῖται: καὶ τότε δὴ ἡ ποσότης τῷ αἵματι πλέον μειᾶται ἢ ἡ ὑγίης ἀπαιτεῖ κατάστασις. ἐντεῦθεν ἡ καρδία καὶ τὰ ἀγγεῖα ἐν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς μᾶλλον ἐξασθενίζονται (κατὰ τὰς

semper utilis esse poterit venæsectio in istis febribus.

§. XXXVIII.

Omne remedium necessarium in morbo quodam, utile esse debet (§. XXVII.). Atqui venæ sectio non semper utilis est in febribus malignis (§. anteced.). Hinc denuo concluditur, venæ sectionem non semper &c.

§. XXXIX.

Ope venæ sectionis quantitas sanguinis imminuitur (§. XXX.): pone iam, casus in §. XXXVI. determinatos non adesse, nihilo tamen minus venæsectionem administrari: illatum vel ad depletionem vasorum instituitur, vel non. Si prius, casus æquipollebit hæmorrhagiæ, quam lethalem fore, dictum erat in §. XXIV: unde venæ sectio in febribus acutis malignis noxium erit remedium (§. XXVII.). Sin autem posterius ponatur, tunc etiam sanguinis quantitas plus imminuitur, quam a sanitatis conditione postulatur: cor ideo & vasa in febribus malignis magis debilitabun-

tabuntur (per princ. patholog.). Sed debilitas vasorum numerum causarum subit, unde excretiones naturales languescunt, ut ideo putridum intra corpus retineatur; quare iam fieri potest, ut venæ sectio, in morbis acutis malignis adhibita, putridæ materiæ excretionem supprimat: a qua causa vero congestiones & inflammationes produci, in superioribus evictum erat. Atque ita in hoc quoque casu noxium remedium erit.

§. XL.

Nullum remedium noxium in morbo quodam poterit esse necessarium (§. XXVII.). Sed iterum fieri potest, ut venæ sectio in febribus acutis malignis nociva sit (§. antec.). Quare neque semper necessaria in iisdem esse poterit.

TANTVM.

παθολογ. ἀρχαίς). Ἄλλ' ἡ τῶν αἰγγείων αἰτονία τῆς αἰτίας συγκαταρτιθμεῖται αἷς αἱ φυσικαὶ ἐκκρίσεις ἐπίσχονται, διὸ καὶ τὸ σηπεδονώδες κατασχεθήσεται τῷ σώματι. ὅθεν παραληφθεῖσα ἡ φλεβοτομία ἐν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς, τὰς τῆς σηπεδονώδους ὕλης ἐκκρίσεις ὑποπιέζει. ἀφ' ἧς αἰτίας συμφορήσεις τῷ αἵματι καὶ φλεγμονὰς ἐντελεῖσθαι ἐν τοῖς ἀνωτέρω εἴρηται. Καὶν τέτοις ἄρα ἡ φλεβοτομία βλαβερὸν ἔσται βοήθημα.

§. μ'.

Οὐδὲν βλαβερὸν βοήθημα ἐν τινὶ νοσήματι ἀναγκαῖον εἶναι δύναται (§. κζ'). Ἀλλὰ δυνατόν τὴν φλεβοτομίαν ἐν τοῖς κακοήθεσι πυρετοῖς βλαπτικὴν εἶναι (§. ἀνωτ.) δυνατόν ἄρα ἐδ' αἰεὶ ἀναγκαίαν τὴν αὐτὴν τέτοις εἶναι.

ΤΟΣΟῦΤΟΝ.

